

KVALITATIVNO – KVANTITATIVNA ANALIZA POLENA



MONITORING STANICA: POFALIĆI

VREMENSKI PERIOD: 19.08. do 25.08.2016.

Zapažanja:

Tokom sedmice na MS Pofalići ukupno je konstatovano 166 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća, trava i korova. Tokom sedmice konstatovane su umjerene koncentracije polena korova (132 pol. zr/m³). Procentualna zastupljenost polena u zraku tokom sedmice je iznosila: Poaceae (33%), Urticaceae (38%), Ambrosia (15%), Plantaginaceae (11%) i Chenopodiaceae (3%).

POLEN ALARM!!!

Tokom protekle sedmice konstatovana je umjerena koncentracija polena korova (132!). Polen korova (vidi polen kalendar) je jak alergjen. Povišene koncentracije su utvrđene dana 24.08.2016. god na MS Stari Grad, a na MS Pofalići dana 22.08.2016.god.

Veće koncentracije polena su konstatovane na području Starog Grada.

Prognoza, savjeti i preporuke:

Varijanje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije.

Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar, tokom naredne sedmice se može očekivati porast polena trava, korova a posebno ambrozije.

Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje što duži boravak u šumskim ekosistemima. U slučaju pojave alergijske reakcije, u prvom momentu se poslužiti vlažnom maramicom i koristiti je kao masku. U slučaju produženih i/ili težih simptoma potrebno je potražiti ljekarsku pomoć (vidi brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).



drveće	trave	korovi
0 zr/m ³	34 zr/m ³	132 zr/m ³



RANI POLEN ALARM !!!



Poaceae (Trave)



Urticaceae (Korovi)




Plantaginaceae (bokvice)




Chenopodiaceae (lobodnjače)

Variranje koncentracije polena (zr/m³) tokom sedmice



% udio polen alergernih biljaka



EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA								
dan datum	Pet 19.08.	Sub 20.08.	Ned 21.08.	Pon 22.08.	Uto 23.08.	Sri 24.08.	Čet 25.08.	Ukupno zr/m ³
DRVEĆE								
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)
Carpinus (grab)
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)
Pinaceae (borovi)
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća								0
TRAVE								
Poaceae (trave)	X	X	.	X	X	X	X	34
Cyperaceae (šiše)
Ukupno polena trava							34	
KOROVI								
Ambrosia (ambrozija)	.	.	X	X	X	X	X	29
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)
Urticaceae (žare)	XX	X	XX	XX	X	XX	XX	75
Asteraceae (glavočike)
Plantaginaceae (bokvice)	X	X	X	X	X	.	X	21
Chenopodiaceae (lobodnjače)	.	X	X	.	.	X	.	7
Ukupno polena korova							132	
Sedmično variranje polena	23	17	26	33	25	18	24	
UKUPNO pol. zr/m³							166	

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)						
POLENSKA SKALA		drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod	
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjeren koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba
XXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetra i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suzenja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergeni biljaka.