

KVALITATIVNO – KVANTITATIVNA ANALIZA POLENA



MONITORING STANICA: POFALIĆI

VREMENSKI PERIOD: 30.09. do 06.10.2016.

Zapažanja:

Tokom sedmice na MS Pofalići ukupno je konstatovano 39 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća i korova. Tokom sedmice su konstatovane niske koncentracije polena drveća i korova. Procentualna zastupljenost polena u zraku tokom sedmice je iznosila: Urticaceae (71,79%), Ambrosia (17,94%), Pinaceae (10,25%).

POLEN ALARM!!!


Tokom protekle sedmice konstatovana je niska do umjerena koncentracija polena korova (35 pol. zr/m³) i niska koncentracija polena drveća (4 pol. zr/m³). Polen korova (vidi polen kalendar) je jak alergen. Visoke koncentracije polena na području Starog Grada je konstatovan 30.10.2016., a na području Novog Sarajeva 30.10. i 01.10.2016. Veće koncentracije polena su konstatovane na području Starog Grada.

Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije.

Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar, tokom naredne sedmice se može očekivati blagi porast polena korova.

Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje što duži boravak u šumskim ekosistemima. U slučaju pojave alergijske reakcije, u prvom momentu se poslužiti vlažnom maramicom i koristiti je kao masku. U slučaju produženih i/ili težih simptoma potrebno je potražiti ljekarsku pomoć (vidi brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).



RANI POLEN ALARM !!!



Urticaceae (Korovi)




Ambrosia (Ambrozija)




Pinaceae (Borovi)

Variranje koncentracije polena (zr/m³) tokom sedmice



% udio polen alergenih biljaka



dan datum	EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA								Ukupno zr/m ³
	Pet 30.09.	Sub 01.10.	Ned 02.10.	Pon 03.10.	Uto 04.10.	Sri 05.10.	Čet 06.10.		
DRVEĆE									
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)
Carpinus (grab)
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)
Pinaceae (borovi)	X	X	4	
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
								Ukupno polena drveća	4
TRAVE									
Poaceae (trave)
Cyperaceae (šaševi)
								Ukupno polena trave	0
KOROVI									
Ambrosia (ambrozija)	X	.	X	X	.	.	.	7	
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)
Urticaceae (žare)	X	X	X	X	X	.	X	28	
Asteraceae (glavočike)
Plantaginaceae (bokvice)
Chenopodiaceae (lobodnjače)
								Ukupno polena korova	35
Sedmično variranje polena	9	9	6	4	2	2	7		
								UKUPNO pol. zr/m³	39

POLENSKA SKALA	KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)				Simptomi alergije se javljaju kod
	drveće	trave	korovi		
X niska koncentracija	1-25	1-15	1-10		izuzetno osjetljivih osoba
XX umjerena koncentracija	26-50	16-90	11-50		puno alergičnih osoba
XXX visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba
XXXX jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetra i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suzenja očiju i nosa, обратити se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergenih biljaka.